

# 予防接種カレンダー

定期接種 期間前公費負担	ワクチン名と種類		接種期間	標準的な接種期間と接種間隔・回数	接種期間								
	1価	5価	生後6週～24週まで 生後6週～32週まで	初回接種は標準的には生後2ヶ月に至った日から生後14週6日までで経口接種。27日以上の間隔を置いて2回。初回接種は標準的には生後2ヶ月に至った日から生後14週6日までで経口接種。27日以上の間隔を置いて3回。	1ヶ月後	2ヶ月後	3ヶ月後	4ヶ月後	5ヶ月後	6ヶ月後	7ヶ月後	8ヶ月後	
ロタウイルス													

定期接種 (有料) 任意接種	ワクチン名と種類		接種期間	標準的な接種期間と接種間隔・回数	接種期間																						
	接種期間		標準的な接種期間と接種間隔・回数	3ヶ月後	6ヶ月後	9ヶ月後	1歳後	1歳2ヶ月後	1歳3ヶ月後	1歳4ヶ月後	1歳5ヶ月後	1歳6ヶ月後	1歳7ヶ月後	1歳8ヶ月後	1歳9ヶ月後	1歳10ヶ月後	1歳11ヶ月後	1歳12ヶ月後	1歳13ヶ月後	1歳14ヶ月後	1歳15ヶ月後	1歳16ヶ月後	1歳17ヶ月後	1歳18ヶ月後	1歳19ヶ月後	1歳20ヶ月後	
定期接種 (期間内原則公費負担)	B型肝炎		生後12ヶ月に至るまで	生後2ヶ月で1回目を接種し、27日以上の間隔を置いて生後3ヶ月で2回目を接種。さらに1回目から139日以上の間隔を置いて生後7ヶ月～生後8ヶ月の間に3回目の合計3回。																							
	五種混合 (DPT-IPV-Hb) ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・Hb感染症		1期：生後2ヶ月～生後90ヶ月(7歳半)に至るまで	1期：初回接種は生後2ヶ月に達した時から生後7ヶ月に至るまでに開始し、20日～56日までの間隔を置いて3回。追加接種は初回接種終了後6ヶ月～18ヶ月までの間隔を置いて1回。																							
	二種混合 (DT) ジフテリア・破傷風		2期：11歳以上13歳未満	2期：ジフテリア、破傷風の2種混合 (DT) の接種で11歳に達した時から12歳に達するまでの間に1回。																							
	BCG		生後12ヶ月に至るまで	生後5ヶ月に達した時から生後8ヶ月に達するまでの間に1回。																							
	麻疹風疹 (二種) 混合 (MR)		1期：生後12ヶ月～生後24ヶ月に至るまで 2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間 (4/1～3/31)	1期：生後12ヶ月～生後24ヶ月に至るまでの間で、できるだけ早期に1回。 2期：5歳以上7歳未満で小学校就学前の1年間 (4/1～3/31) に1回。																							
任意接種	インフルエンザ		生後6ヶ月以上	13歳未満は2～4週 (4週が望ましい)の間隔で毎年2回。																							
	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)		1歳以上	1歳以降に1回。より確実に免疫をつけるには、小学校入学前の1年間に2回目の接種がおすすめされる。																							
	水ぼうそう (水痘)		生後12ヶ月～生後36ヶ月に至るまで	初回接種は生後12ヶ月～生後15ヶ月に至るまでの間に1回。追加接種は初回接種終了後3ヶ月以上、標準的には6ヶ月～12ヶ月までの間隔を置いて1回。 1期：初回接種は3歳に達した時から4歳に達するまでの間に6日以上、標準的には6日～28日までの間隔を置いて2回。追加接種は初回接種終了後6ヶ月以上、標準的には約1年おいて4歳に達した時から5歳に達するまでの間に1回。 2期：9歳に達した時から10歳に達するまでの間に1回。																							

注1)：平成7 (1995) 年4月2日から平成19 (2007) 年4月1日に生まれ、第1期、第2期の接種を受けられなかった人は、20歳未満であれば、定期接種として受けることができます。

■ 対象年齢 ■ 標準的な接種期間